
PREPARAZIONE ALL'ESECUZIONE DI ESAMI DI RM CON MDC

Per l'esecuzione dell'esame RM con mezzo di contrasto, occorre aver effettuato i seguenti esami ematici:

- CREATININEMIA
- FILTRATO GLOMERULARE
- GLICEMIA
- AZOTEMIA

N.B. Gli esami devono essere stati eseguiti inderogabilmente non oltre un mese prima dell'indagine radiologica.

Il paziente dovrà eseguire un digiuno di almeno 6 (sei) ore prima di sottoporsi all'esame, potrà bere acqua o the. Non va sospesa l'assunzione di farmaci abitualmente assunti.

Si raccomanda di portare eventuali esami radiologici precedenti (TC, RM, Ecografia PT-TC etc) e se sottoposto a interventi chirurgici cartella clinica e/o lettera di dimissioni.

Allergie

Il medico richiedente e/o lo specialista radiologo prima di un esame con MdC raccoglie un'anamnesi accurata che permetta l'identificazione dei pazienti a rischio ovvero pazienti con:

- pregressa reazione allergica o simil-allergica a seguito di un'indagine con la medesima classe di MdC da impiegare (per es., a base di gadolinio o di iodio);
- presenza di asma bronchiale o orticaria-angioedema non controllati dalla terapia farmacologica;
- mastocitosi;
- pregressa anafilassi idiopatica (ovvero storia di episodio/i di anafilassi in cui non è riconoscibile la causa scatenante).

In caso di un'allergia nota al mezzo di contrasto, bisogna rivolgersi al proprio medico e/o al medico radiologo per valutare la possibilità di eseguire indagini alternative.

Se è confermata la necessità di effettuare l'esame rivolgersi al servizio di radiodiagnostica della nostra struttura e poi presentare al proprio Medico Curante il protocollo di premedicazione per i soggetti con ipersensibilità predisposto dalle nuove linee guida SIRM-SIAAIC e le indicazioni dell' American College of Radiology, per ridurre il rischio di reazioni importanti.

Schema di premedicazione consigliato:

- prednisone 25 mg, due compresse os 13, 7 ed 1 ora prima dell'esame;
- antistaminico (per es. levocetirizina dicloridrato) 1 compressa os 48, 24 ed 1 ora prima dell'esame;
- inibitore di pompa protonica od inibitore H2 (p. es pantoprazolo 40 mg o ranitidina 300 mg), una compressa os 48, 24 e 2 ore prima dell'esame.

Condizioni particolari

Pazienti portatori di PM o PM-ICD non possono effettuare l'esame RM presso la nostra struttura.

Il paziente portatore di loop recorder può effettuare l'esame RM.

Il paziente sottoposto ad impianto cocleare non può effettuare l'esame RM.

In caso di protesi ortopediche è indispensabile la documentazione relativa al materiale dell'ortesi: in mancanza di tale dato l'esame non potrà essere assolutamente effettuato.

I pazienti con filtrato glomerulare inferiore od uguale 30ml/min/1.73 mq non possono essere sottoposti ad esame con MdC.

Paziente con IUD (dispositivo intrauterino): la paziente con IUD potrà essere sottoposta ad indagine RM e dovrà impegnarsi a contattare il proprio ginecologo di fiducia per verificare eventuali dislocazioni del dispositivo dopo l'esecuzione dell'esame. In attesa di tale controllo e sempre secondo indicazioni specialistiche la paziente dovrà ovviare, a titolo meramente precauzionale, con altri metodi contraccettivi.

Il giorno dell'esame andrà esibita:

- Impegnativa del medico curante e/o richiesta del medico specialista richiedente l'esame;
- Tessera Sanitaria;
- Documento di identità.